

九段坂病院大腸内視鏡検査をご紹介くださる先生方へ

九段坂病院では便潜血陽性などで大腸内視鏡検査が必要な患者様に対し、事前に当院の外来受診せずに、近隣の先生方からのご紹介で、大腸内視鏡検査をさせていただきます。

1. ご予約から検査までの流れ

①検査申込	九段坂病院地域連携室にFax予約申込書を送付ください。 Tel：03-3262-9316 Fax：03-3262-9317（連携室直通）
②内視鏡日時決定	内視鏡検査の予約をお取りして、ご紹介医療機関へ 予約票と説明書類をFax送信します。
③ご紹介元で 説明と下剤処方	「大腸内視鏡検査を受けられる方へ」用いて説明をお願いします。 内視鏡前日に内服する薬剤の処方をお願いします。
④内視鏡前日21時 下剤内服	内視鏡検査前日21時頃に下剤の内服をお願いします。
⑤内視鏡検査	来院受付後、診察・同意書取得します。 検査前処置を行い午後内視鏡検査です。

2. 患者様に説明いただきたい事項

「大腸内視鏡を受けられる方へ」(ホームページにあり)をご活用の上説明をお願いします。

1)前日の食事について

消化の悪いもの避けていただくよう指導お願いいたします(特にキノコ類、海藻類、豆類、果物、野菜)。夕食は20時までに済ませ、夕食後は何も召し上がらないようにお願いします。水分(水、お茶、紅茶など透明なもの)は飲んでいただいて結構です。

2)前日の下剤について

プルゼニド錠2錠または、アローゼン1.0gの処方と検査前日寝る前(21時ごろ)に内服をお願いいたします。患者様の便秘の程度に応じて追加処方もしくは省いていただいてもかまいません。

3)抗血小板薬、抗凝固薬などについて

休薬しなくても検査は可能です。ポリープが見つかった場合、後日の切除になる可能性が高いことをお伝えください。別紙薬剤資料を参照していただき、必要に応じて休薬の検討と指示の上、診療情報にご記入をお願いします。

4)前日のその他の内服薬について

通常通り内服お願いいたします。

5)当日の注意事項について

- ①食事について:朝から絶食になります。飲水は同様に可能です。
- ②内服薬:朝の内服薬は糖尿病薬以外、起床後に内服してください。
- ③ポリープ切除した場合:一泊入院になる可能性があることをお伝えください。

6)その他

高度の便秘のある患者様の場合:腸管前処置の調整が必要となりますので、検査を直接予約される前に一度当院を受診していただくことをお勧めします。

内視鏡治療等の休薬期間の目安

分類	一般名	商品名 赤字：当院採用品 / 青字：院外限定採用品 / 黒字：その他	休薬の目安
抗凝固薬 ……出血のリスクあり			
DOAC	エドキサバントシル酸塩水和物	リクシアナ	1日
	リバーロキサバン	イグザレルト	1日
	アビキサバン	エリキュース	2日
	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	ブラザキサ	1日
ワーファリン	ワルファリンカリウム	ワーファリン,ワルファリンK	4~5日
抗血小板薬・血小板凝集能抑制作用を有する薬剤 ……出血のリスクあり			
抗血小板薬	アスピリン	アスピリン,バイアスピリン,アスピリン腸溶錠	7~10日
	アスピリン・ダイアルミネート	バファリンA81,アスファネートA81,ニトギスA81,パッサミンA81,ファモターA81	7~10日
	アスピリン・クロピドグレル硫酸塩	コンブラピン配合錠	14日
	アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩	キャブピリン配合錠	7~10日
	アスピリン・ランソプラゾール	タケルダ配合錠	7~10日
	クロピドグレル硫酸塩	ブラビックス, クロピドグレル	14日
	プラスグレル塩酸塩	エフィエント	14日
	チカグレロル	ブリリント	5日以上
	チクロピジン塩酸塩	チクロピジン, パナルジン, マイトジン	10~14日
	シロスタゾール	シロスタゾール, プレタール	2日
	サルボグレラート塩酸塩	アンブラーグ, サルボグレラート塩酸塩	1日
	イコサペント酸エチル	エバデールS, イコサペント酸エチル	7~10日
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ	7~10日
	ベラプロストナトリウム	ドルナー, プロサイリン, ベラプロストナトリウム, ベラプロストNa, ケアロードLA*, ベラサスLA	1日
	リマプロスト アルファデクス	プロレナール, オバルモン, リマプロストアルファデクス	1日
	ジラゼブ塩酸塩	コメリアンコーワ, ジラゼブ塩酸塩	1日
	抗冠張血管薬	ジビリダモール・徐放	ベルサンチン, ジビリダモール
トラビジル		ロコルナール, トラビジル	2日
イブジラスト		ケタス	3日
脳改善循環薬代謝	イフェンプロジル酒石酸塩	セロクラール, イフェンプロジル酒石酸塩	2日
	ニセルゴリン	サアミオン, ニセルゴリン	3日